

Annexe 4.8: liste de conservation des principaux injectables après utilisation partielle. Attention, cette liste s'applique pour les solutions utilisées par MSF et les informations ne sont pas garanties pour d'autres substances. Ce document sert d'illustration, une validation des données auprès des fabricants est indiquée lors de l'utilisation de ces substances.

Liste confiée par la D^{re} Pittet, médecin pédiatre à MSF.

Nom générique	Conservation : durée après ouverture
Amoxicilline + Ac. clavulanique	Utilisation immédiate après reconstitution
Ampicilline	Utilisation immédiate après reconstitution
Artésunate	Utilisation immédiate après reconstitution
Ceftriaxone	Solution stable au réfrigérateur pendant 72 h et 24 h à température ambiante (variable selon les fabricants)
Cloxacilline	Utilisation immédiate après reconstitution
Dexaméthasone	Dilution en perfusion stable pendant 24 h
Diazépam	Utilisation immédiate après ouverture
Epinéphrine (Adrénaline)	Utilisation immédiate après ouverture
Furosémide	Utilisation immédiate après ouverture
Gentamycine sulfate	Dilution en perfusion stable pendant 24 h
Benzathine Benzylpenicillin	Après reconstitution stable au réfrigérateur pendant 24 h
Complexe B	Utilisation immédiate après ouverture
Salbutamol	Utilisation immédiate après ouverture